

## INSTRUCTIONS

Équipement de protection individuelle Mouthguard FLUORITE pour des sports de levage CATEGORIE DFI 1  
- Règlement de l'UE 2016/425


## UTILISATION

Les athlètes soulevant des poids / haltères sont priés à la hauteur de l'effort mental et physique pour fermer la bouche en serrant violemment les dents les uns avec les autres et rappelant l'énergie utile au mouvement lui-même. Il est particulièrement indiqué :


# FLUORITE Bite




squat




dans l'élan



Dans le deadlift Dans le



la déchirure et de boucle



### mouthguards FLUORITE les sont destinés à être utilisés:

- dans le sport, sans contact avec les mains exigences physiques (voir le tableau 1) limitée aux disciplines de levée de poids;
- par des personnes (au-dessus de 18 ans inclus),
- pour éviter que les dents scheggiino, pendant la fenêtre de freinage du même.
- pour protéger l'émail, le tissu extérieur de la dent, par un traumatisme mécanique due aux frottements et de l'impact entre les dents.

### classe de danger

Au cours de la recherche pour l'étude du produit, il a été pris en compte CLASSEMENT DU SPORT SELON LES CONTACTS D'impact (réf Gotlin- Degarri dans la revue Value en 2010) éditeur sport SEI présentés dans le tableau 1:

## légalisation

La législation envisagée pour ce dispositif est le suivant:

code	année	titre
Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil	9 mars 2016	Sur l'équipement de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686 / CEE
Décret législatif 6 septembre tembre 2005, n. 208 et smi	6 septembre 2005	www.codiceconsumo.it du Code de la consommation
Directive 1990/44 / CE modifié	25 mai 1999	En ce qui concerne certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation
DIRECTIVE 2011/83 / UE	25 octobre 2011	Sur les droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13 / CEE et de la directive 1999/44 / CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/371 / CEE et de la directive 97/7 / CE le Parlement européen et du Conseil
DECRET LEGISLATIF 21 Février 2014, n. 21	21 février 2014	La mise en œuvre de la directive 2011/83 / UE sur les droits des consommateurs, modifiant les directives du Conseil 93/13 / CEE et 1999/44 / CE et abrogeant les directives 85/371 / CEE et 97/7 / CE
Règlement (CE) n 1907/2006 tel que modifié	18 décembre 2006	En ce qui concerne l'enregistrement, l'évaluation, autorization et des substances chimiques (REACH), CREA constitue une Agence européenne des produits chimiques.
Règlement (CE) n ° 1272/2008	18 décembre 2008	Sur la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548 / CEE et 1999/45 / CE et modifiant le règlement (CE) n 1907/2006
Règlement (CE) n ° 1907/2006 (REACH)	18 Décembre 2006	concernant l'enregistrement, l'évaluation, autorization et des substances chimiques (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45 / CE et abrogeant la réglementation à ( CEE), 79/393 et le règlement (CE) n ° 1488/94 et la directive 76/759 / CEE du Conseil et les directives 91/155 / CEE, 93/87 / CEE, 93/105 / CE et 2000/21 / CE
UNI EN 1198-1	2003	Matières et objets en contact avec les denrées alimentaires - matières plastiques - Guide pour la sélection des conditions et méthodes d'essai pour la migration globale
UNI EN 1198-3	2003	Matières et objets en contact avec les denrées alimentaires - matières plastiques - Méthodes d'essai de migration globale dans médium alimentaire SI aqueux par immersion totale
UNI EN ISO 10993-10	2013	Évaluation biologique des dispositifs médicaux - Partie 10: Essais d'irritation et de sensibilisation de la peau

Tab 1

Les sports de contact		Sport Contactless		
impact limité	collision	exigences physiques mince	exigences physiques modérée	exigences physiques haut
basket-ball	boxe	golf	Tennis de table	aérobie
volley-ball	art martial	tir à l'arc	badminton	tennis
handball	combat	Tir à la cible	escrime	Atléisme: lancers
Baseball / football	hockey	tir Wing	Vela	Atléisme: Course
squash	football	exercices gymnastiques so- lasto masse corporelle	gymnastique artistique	natation
cyclisme	football		Tennis	randonnée
Atléisme: sauts	rugby	Majorette		aviron
Gymnastique: Outils				Haltérophilie
équitation				
patinage				
ski alpin				
ski nordique				
ski nautique				
bob				
karting				

**évaluation**

Sur la base de l'annexe I à CATEGORIE DE RISQUE DE PPE « du décret n codifié, 04/12/1992 » 475 et le décret-loi n °, 02/01/1997 10 et DIRECTIVE DU CONSEIL 89/686 /CEE du Conseil du 21 Décembre 1989 et l'UE REG 2016/425, le FLUORbite dans ses deux déclinaisons ne comprend que le minimum de risque suivants contenus dans la catégorie 1 indiquée ci-dessous:

- a. des lésions mécaniques superficielles;
  - b. contact avec des produits de nettoyage légèrement agressifs ou un contact prolongé avec l'eau;
  - c. contact avec des surfaces chaudes qui ne dépassent pas 50 ° C;
  - d. lésions cutanées dues à l'exposition à la lumière solaire (différentes de blessures dues à l'observation du soleil);
  - e. la nature des conditions atmosphériques ne sont pas évitables.
- Non EPI de conception complète destiné à protéger contre les risques de chocs ou de blessures graves, ou des chocs étendus et permanents dans la nature et sont donc soumis à répétition d'évaluation de la conformité en fonction du contrôle de la production interne (produit A) visé à l'annexe IV UE REG 2016/425

**durée de vie moyenne**

La durée du produit en fonction de l'expérience est estimée à un an. La durée peut être limitée en fonction de la manière d'utiliser et de la périodicité.

**Emballage et instructions pour l'élimination**

Les dispositions ci-après pour l'élimination des matériaux d'emballage et l'EPI à la fin de vie utile.

producto	tipologia Material/numero	simbolo	descrizione
cas primaire et transport	polypropylene		collecte
Conditionnement primaire emballage de vente	polyéthylène		collecte
dispositif de protection	silicone		Indifférence pas décharge

\*La carte doit être mise au rebut dans le papier.

**avertissements**


Utiliser, entretenir et utiliser le protecteur buccal suivant ces instructions. Le non-respect de ces recommandations et instructions peut sérieusement affecter l'effet protecteur du protecteur. L'EPI doit être utilisé pendant toute la durée du stress afin d'efficacité correcte. La bonne utilisation de protecteur-dents, est soumise à l'information, la formation et surtout après/avant le mention de l'utilisateur.

Il ne doivent pas être utilisés de détergents puissants mais seulement ceux recommandés afin d'éviter d'endommager le produit. Ce produit peut être endommagé par certains produits chimiques (alcool, de l'acétone, Les solvants, Etc.). Des informations supplémentaires devraient être obtenus auprès du fabricant. Le protecteur-dents doit être remplacé chaque fois qu'il ya des dommages à prouver et doit être porté que si préalablement nettoyés. Ne pas mâcher le protecteur-dents.

Remplacez votre protecteur-dents régulièrement en particulier en cas d'utilisation fréquente.

**Ne pas utiliser:**

- Si vous avez moins de 18 ans.
- Si vos dents se déplaçant.
- Si votre dentiste vous a dit que vous avez l'articulation des troubles de l'articulation tempo-mandibulaire.
- Si vous avez mal aux dents, douleur à la mâchoire, bégayer l'ouverture de la bouche ou la douleur
- provoquée par bruxisme ou des grincements de dents, ou le flegme de muscles masticateurs.
- pendant plus de trois mois sans consulter votre dentiste.
- quand vous dormez; Il pourrait être avalé accidentellement.



**Instructions**

**positionnement:**  
Le protecteur-dents se trouve avoir une forme ergonomique de tels sorte que le sous lingue raccord doit être placé sous la langue.

Tous les revêtements, alors que la tendresse de la matière, mais pas provoqué des blessures à l'utilisateur

Avec le protecteur-dents correctement la position ne fournit un maximum de confort. Ne placez l'embout buccal après utilisation ou pendant l'utilisation, sur les surfaces proéminentes ou sales, mais le remettre dans son état lorsqu'il ne sont pas portés. Ne jamais porter le protecteur-dents d'une autre personne et ne pas permettre aux autres d'utiliser votre propre. Outre le risque de contamination croisée, la protection peut être altérée, et le protecteur-dents endommagé au-delà de la réparation. Ne jamais porter le protecteur-dents avec un appareil orthodontique mobile ou avec la prothèse dentaire amovible.

Si vous effectuez un traitement orthodontique avec des supports fixes ou invisibles peuvent utiliser aligneurs la garde de la bouche après une visite de votre orthodontiste de confiance. Protecteur-dents doit être utilisé uniquement comme un équipement de protection individuelle conformément à ces instructions.

Is ne doivent jamais être utilisés à d'autres fins, tels que les dispositifs médicaux. Ne pas mâcher le protecteur-dents


**Nettoyage et stockage**

Évitez à l'eau froide le protecteur-dents avant chaque utilisation. Utiliser de l'eau propre et fraîche la température ne doit pas dépasser 35 ° C et une brosse pour laver et nettoyer le protecteur-dents, après chaque utilisation à sec avant de les stocker dans la boîte. Ne pas utiliser du dentifrice, des détergents ou d'autres produits de nettoyage. Après chaque utilisation, lavez l'embout buccal et son logement avec un rince-bouche antiseptique. Ne pas exposer à la moutonnage de fortes sources de chaleur, par exemple, ne l'ait pas dans la lave-vaisselle, dans le lave-linge à laver, sécher, dans le four, sur les tables de bord chaud dans les voitures et éviter l'exposition directe aux rayons du soleil.

Le protecteur-dents doit être conservé dans une boîte quand il est pas utilisé, dans un environnement avec une température stable et non exposé à la lumière solaire directe. Lorsque les conditions extérieures de chaleur sont élevées, nous vous suggérons de garder votre protecteur-dents dans un récipient avec de l'eau.

Gardez toujours son portable dans la boîte lorsqu'il n'est pas en cours d'utilisation. Écrivez le nom de la personne qui le porte sur la couverture à l'encore insalable. Vérifiez votre protecteur-dents avec une inspection visuelle minutieuse est à la fois manuel avant et après chaque utilisation. Le protecteur-dents doit être remplacé immédiatement en cas de ponctions accidentelles, des fissures, des lésures, des fractures, ou si l'embout buccal apparaît en mauvais état. Ce ne moutonnage constant pas de latex ou des matériaux qui avec les connaissances actuelles peuvent causer des réactions allergiques ou une sensibilisation. Les protecteur-dents sont soumis à un contrôle de qualité à l'aide de silice de qualité médicale qui ne provoque pas de réactions allergiques et n'a pas d'effet perceptible ou le goût.

**Vers insertion**



Conservez ces instructions. Utilisez jusqu'à 30 minutes par jour.

dents pointées et en particulier surlégué muscles masticateurs peuvent réduire considérablement la durée de vie moyenne des EPI en cours d'utilisation. Le récipient fermé et stocké dans des conditions idéales à une durée de vie de 2 ans à compter de la date de fabrication. Tenir à l'écart des enfants. Si pendant l'utilisation peut se produire des nausées ou des vertiges, arrêtez d'utiliser. Ne pas utiliser si vous souffrez de crises.

**FLUORbite®**



\* Voir arrière du paquet

Silgem srl Via Marconi 35 Val della Torre (TO) CAP 10040 CF / IVA 0948250015 REA TO-1056099

+39 0119689621 info@silgem.it



\* Voir arrière du paquet

